Prontosan® – Wound Irrigation Solution

Vor Anwendung Gebrauchsinformation lesen
Read instruction for use.
Прочетете указанията за употреба.
Přečtěte si pokyny k použití
Læs brugsanvisningen.
Lugege kasutusjuhendit.

Haltbarkeit nach Öffnung: 8 Wochen
Shelf life after opening: 8 weeks
Срок на годност след отваряне: 8 седмици
Doba použitelnosti po otevření: 8 týdnů
Holdbarhed efter åbning: 8 uger.
Säilivusaeg pärast avamist: 8 nädalat.

Verwendbar bis: Monat und Jahr
Use by: month and year
Да се използва до: месец и година
Spotřebujte do: měsíc a rok
Anvendes senest: måned og år.
Säilivusaeg: kuu ja aasta

Katalognummer
Catalog number
Каталожен номер
Katalogové číslo
Varenummer
Kataloog number

Chargennummer
Batch number
Партиден номер
Číslo šarže
Varenr.
Partii number

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Keep out of reach of children.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hersteller
Manufacturer
Производител
Výrobce
Producent
Tootja

Nur zum einmaligen Gebrauch.
Single use only.
Само за еднократна употреба.
Pouze na jedno použití.
Kun til engangsbrug.
Ainult ühekordseks kasutamiseks.

EC REP
EU Authorized Representative
EU-Bevollmächtigter
Упълномощен представител за ЕС
Oviašteni představník v EU
Autoriseret EU-repræsentant
Volitatud esindaja ÜS

Unique Device Identifier
Einmalige Produktkennung
Уникален идентификатор на изделие
Jedinečný identifikátor prostředku
Unik enhedsidentifikator
Seadme kordumatu identifikaator

Importer
Importeur
Вносител
Dovozce
Importør
Importija

GB Prontosan® – Wound Irrigation Solution

Instructions for use for cleansing, rinsing and moistening of acute, chronic and infected skin wounds, 1st and 2nd degree burns

1. Introduction: Chronic skin wounds are often coated with slough, necrotic tissue and/or biofilm. These coatings are difficult to remove and lead to delayed wound healing. Prontosan® Wound Irrigation Solution is able to remove these barriers to wound healing through its cleansing activity.

Acute wounds also require proper cleansing as they are generally contaminated with debris and microorganisms. These contaminants can interfere with the normal wound healing process and lead to complications such as infection. Due to the unique combination of ingredients (i.e. the antimicrobial substance, polihexanide, and the surfactant, be-taine), Prontosan® is ideal for the prevention of biofilm formation.

2. Product profile and areas for use
For cleaning and irrigation plus moistening of:
a) acute non-infected and infected wounds: - traumatic wounds (e.g. skin lacerations, bites, cuts or crush injuries); -postoperative wounds.
b) chronic non-infected and infected wounds including: pressure sores; venous ulcers; diabetic ulcers.
c) thermal and chemical wounds: 1st and 2nd degree burns; chemical burns.
d) post-radiation wounds.
e) fistulas and abscesses.
f) entry ports of urological catheters, PEG/PEJ tubes or drainage tubes.
g) peristomal skin.

For intraoperative cleansing and irrigation of wounds.
For instillation in combination with negative pressure wound therapy.
For moistening encrusted dressings and bandages prior to removal.

3. General safety instructions: For external use only. Do not use for infusion or injection. Do not swallow.
Do not use damaged bottles. Keep bottles away from direct sunlight. Keep out of reach of children.

10. Summry / technical information: Prontosan® Wound Irrigation Solution is a preserved product and has a shelf life of 8 weeks after opening. The bottle should be closed immediately after use to prevent contamination. The top of the bottle should be protected from contamination during use. Bottles that have come into direct contact with the wound or have become contaminated in another way must be discarded.

Composition: Purified Water, betaine surfactant, 0.1% polyaminopropyl biguanide (Polihexanide). **Appearance and smell:** clear, colourless and virtually odourless, aqueous solution. **Shelf life:** according to the expiry date; store at room temperature. **Drug plates:** sterile, originality seal. **Ampoules:** for single use only.

4. Wound cleaning: The entire wound, as well as the surrounding area, should be thoroughly cleansed with Prontosan® Wound Irrigation Solution.
For non-severe and acute wounds rinsing is sufficient. For wounds covering a large area and also wounds difficult to access, soaking the affected area with Prontosan® Wound Irrigation Solution for at least 15 minutes with a saturated compress is recommended. The solution should be used undiluted

5. Tissue tolerability and biocompatibility: Dermatologically tested and evaluated as non-irritating and well-tolerated; painless; no inhibition of granulation or epithelialisation.

6. Side effects: In very rare cases, there may be a mild burning sensation after application of Prontosan®, but this usually dissipates after a few minutes. Prontosan® can cause allergic reactions such as itching (urticaria) and rashes (exanthema). In rare cases (less than 1 out of 10,000), anaphylactic shock has been reported.

7. Contraindications:
Prontosan® should not be used:
a) if the patient is known to be allergic or if it is suspected that the patient may be allergic to one of the ingredients of the product.
b) on the CNS or the meninges.
c) in the middle or inner ear.
d) in the eyes.
e) on hyalinine cartilage and in aseptic joint surgery. If Prontosan® does come into contact with aseptic cartilage, it should be immediately irrigated with Ringer's solution or normal saline.
f) in combination with anionic tensides.
g) in combination with cleansing soaps, ointments, oils, enzymes, etc. These substances should be thoroughly removed from the wound before use.
h) for peritoneal lavage or rinsing.

8. Restrictions of use: Pregnancy and lactation period: There is no evidence of mutagenic or embryo toxicity associated with the ingredients of this product. As there is no systemic reabsorption of polihexanide, transmission to breast milk is unlikely. Due to the lack of relevant clinical trials and clinical experience with pregnant and breast feeding women, Prontosan® Wound Irrigation Solution should only be used after careful medical consultation in these cases.

9. General safety instructions: For external use only. Do not use for infusion or injection. Do not swallow.
Do not use damaged bottles. Keep bottles away from direct sunlight. Keep out of reach of children.

10. Summry / technical information: Prontosan® Wound Irrigation Solution is a preserved product and has a shelf life of 8 weeks after opening. The bottle should be closed immediately after use to prevent contamination. The top of the bottle should be protected from contamination during use. Bottles that have come into direct contact with the wound or have become contaminated in another way must be discarded.

Composition: Purified Water, betaine surfactant, 0.1% polyaminopropyl biguanide (Polihexanide). **Appearance and smell:** clear, colourless and virtually odourless, aqueous solution. **Shelf life:** according to the expiry date; store at room temperature. **Drug plates:** sterile, originality seal. **Ampoules:** for single use only.

4. Wound cleaning: The entire wound, as well as the surrounding area, should be thoroughly cleansed with Prontosan® Wound Irrigation Solution.
For non-severe and acute wounds rinsing is sufficient. For wounds covering a large area and also wounds difficult to access, soaking the affected area with Prontosan® Wound Irrigation Solution for at least 15 minutes with a saturated compress is recommended. The solution should be used undiluted

5. Tissue tolerability and biocompatibility: Dermatologically tested and evaluated as non-irritating and well-tolerated; painless; no inhibition of granulation or epithelialisation.

6. Side effects: In very rare cases, there may be a mild burning sensation after application of Prontosan®, but this usually dissipates after a few minutes. Prontosan® can cause allergic reactions such as itching (urticaria) and rashes (exanthema). In rare cases (less than 1 out of 10,000), anaphylactic shock has been reported.

7. Contraindications:
Prontosan® should not be used:
a) if the patient is known to be allergic or if it is suspected that the patient may be allergic to one of the ingredients of the product.
b) on the CNS or the meninges.
c) in the middle or inner ear.
d) in the eyes.
e) on hyalinine cartilage and in aseptic joint surgery. If Prontosan® does come into contact with aseptic cartilage, it should be immediately irrigated with Ringer's solution or normal saline.
f) in combination with anionic tensides.
g) in combination with cleansing soaps, ointments, oils, enzymes, etc. These substances should be thoroughly removed from the wound before use.
h) for peritoneal lavage or rinsing.

8. Restrictions of use: Pregnancy and lactation period: There is no evidence of mutagenic or embryo toxicity associated with the ingredients of this product. As there is no systemic reabsorption of polihexanide, transmission to breast milk is unlikely. Due to the lack of relevant clinical trials and clinical experience with pregnant and breast feeding women, Prontosan® Wound Irrigation Solution should only be used after careful medical consultation in these cases.

9. General safety instructions: For external use only. Do not use for infusion or injection. Do not swallow.
Do not use damaged bottles. Keep bottles away from direct sunlight. Keep out of reach of children.

10. Summry / technical information: Prontosan® Wound Irrigation Solution is a preserved product and has a shelf life of 8 weeks after opening. The bottle should be closed immediately after use to prevent contamination. The top of the bottle should be protected from contamination during use. Bottles that have come into direct contact with the wound or have become contaminated in another way must be discarded.

Composition: Purified Water, betaine surfactant, 0.1% polyaminopropyl biguanide (Polihexanide). **Appearance and smell:** clear, colourless and virtually odourless, aqueous solution. **Shelf life:** according to the expiry date; store at room temperature. **Drug plates:** sterile, originality seal. **Ampoules:** for single use only.

4. Wound cleaning: The entire wound, as well as the surrounding area, should be thoroughly cleansed with Prontosan® Wound Irrigation Solution.
For non-severe and acute wounds rinsing is sufficient. For wounds covering a large area and also wounds difficult to access, soaking the affected area with Prontosan® Wound Irrigation Solution for at least 15 minutes with a saturated compress is recommended. The solution should be used undiluted

DE Prontosan® – Wundspüllösung

Gebrauchsanweisung für die Reinigung, Spülung und Befeuchtung von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades

1. Einführung: Chronische Hautwunden sind häufig mit Schorf, nekrotischem Gewebe und/oder einem Biofilm bedeckt. Diese Beläge lassen sich nur schwer entfernen und führen zur verzögerten Wundheilung. Durch ihre Reinigungswirkung kann Prontosan® Wundspüllösung diese Hindernisse für die Wundheilung beseitigen.
Da akute Wunden allgemein mit Rückständen und Mikroorganismen verunreinigt sind, erfordern sie außerdem eine gründliche Reinigung. Diese Verunreinigungen können den normalen Wundheilungsprozess behindern und zu Komplikationen wie einer Infektion führen.
Durch die einzigartige Kombination der Inhaltsstoffe (d. h. die antimikrobielle Substanz Polihexanid und das Tensid Betain) eignet sich die Wundspüllösung Prontosan® optimal dafür, die Bildung eines Biofilms zu verhindern.

2. Produktprofil und Anwendungsbereiche:
Zur Reinigung und Spülung sowie Befeuchtung von:
a) akuten infizierten und nicht infizierten Wunden: - traumatische Wunden wie z.B. Hautlazerationen, Bisswunden, Schnitt- und Quetschwunden; postoperative Wunden.
b) chronischen infizierten und nicht infizierten Wunden: Dekubitalulzera; arterio-venöse Ulzera; diabetische Ulzera
c) thermischen und chemischen Wunden: Verbrennungen 1. und 2. Grades; Verätzungen des Integumentums.
d) Strahlenwunden.
e) Fisteln und Abszesse.
f) Eintrittsporten für urologische Katheter, PEG-/PEJ-Sonden oder Drainageschläuche.
g) peristomale Hautareale.

Zur intraoperativen Reinigung und Spülung von Wunden.
Zur Instillation / Kombination mit der Wundbehandlung mit Unterdruck.
Zum Befeuchten verkrusteter Wundauflagen und Verbände vor deren Entfernen.

3. Allgemeine Anwendung: Prontosan® Wundspüllösung (siehe separate produktinformation) ist zur Reinigung von Wunden vor der Behandlung mit Prontosan® Wund Gel oder Prontosan® Wund Gel X vorgesehen.
Prontosan® Wundspüllösung kann zum Durchtränken von Kompressen, Multi-Zwischenlagen oder -tupfern für den Reinigungsvorgang genutzt werden.
Damit eine sichtbar saubere Wunde erreicht und beibehalten wird, sollte die Anwendung häufig erfolgen.
Prontosan® Wundspüllösung kann vor der Anwendung auf Körpertemperatur erwärmt werden.
Häufig sind Wundauflagen und -verbände verkrustet und kleben auf der Wundoberfläche fest. Durch das Entfernen dieser Auflagen kann es zur Verletzung des Wundbetts kommen, was schmerzlich die Wundheilung verzögert. Wenn sich Auflagen und Verbände aufgrund von Verkrustungen nur schwer ablösen lassen, sollten diese mit Prontosan® Wundspüllösung durchtränkt werden, bis sie leicht zu entfernen sind.

4. Wundreinigung: Die gesamte Wunde, einschließlich des an sie angrenzenden Bereichs, ist sorgfältig mit Prontosan® Wundspüllösung zu säubern.
Bei leichten und akuten Wunden reicht ein Ausspülen. Bei großflächigen Wunden sowie auch bei schwer zugänglichen Wunden wird empfohlen, die betroffene Stelle mindestens 15 Minuten lang mit einer mit Prontosan® Wundspüllösung getränkten Kompresse zu befeuchten. Die Lösung ist unverdünnt anzuwenden.

5. Gewebeverträglichkeit und biologische Kompatibilität: Dermatologisch getestet und als nicht irritativ und gut verträglich eingestuft. Schmerzlos anwendbar. Keine Hemmung der Granulation und Epithelisierung.

6. Nebenwirkungen: In sehr seltenen Fällen kann nach Auftragen von Prontosan® ein leichtes Brennen auftreten, welches jedoch in der Regel nach wenigen Minuten wieder verschwindet. Prontosan® kann allergische Reaktionen wie Juckreiz (Urtikaria) und Hautausschläge (Exanthem) hervorrufen. Sehr selten (weniger als 1 Behandelter von 10.000 ist betroffen) wurde über anaphylaktische Schockreaktionen berichtet.

7. Gegenanzeigen:
Prontosan® sollte nicht angewendet werden:
a) bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe des Produkts.
b) im ZNS oder in den Hirnhäuten.
c) im Mittel- oder Innenohr.
d) im Auge.
e) auf hyalinem Knorpel und in der aseptischen Gelenkchirurgie. Sollte Prontosan® in Kontakt mit aseptischem Knorpel gelangen, hat eine sofortige Spülung mit Ringer-Lösung oder isotonischer Kochsalzlösung zu erfolgen.
f) in Kombination mit anionischen Tensiden.
g) zusammen mit reinigenden Seifen, Salben, Ölen, Enzymen usw. Diese Substanzen sind vor der Anwendung sorgfältig von der Wunde zu entfernen.
h) zur Peritoneallavage oder -spülung.

8. Anwendungsbeschränkungen: Schwangerschaft und Stillzeit: Es gibt keine Nachweise für eine mit den Bestandteilen des Produktes einhergehende Mutagenität oder Embryotoxität. Da keine systemische Wiederaufnahme von Polihexanid erfolgt, ist ein Übertritt in die Muttermilch unwahrscheinlich. Wegen des Mangels an relevanten klinischen Prüfungen und klinischer Erfahrung bei Schwangeren und Stillenden sollte bei diesen Personen die Anwendung von Prontosan® Wundspüllösung nur nach sorgfältiger medizinischer Konsultation erfolgen.

9. Allgemeine Sicherheitshinweise: Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zur Injektion oder Infusion anwenden. Nicht einnehmen. Inhalt beschädigter Flaschen nicht verwenden. Flaschen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Kindern sicher aufbewahren.

10. Zusammenfassung/technische Angaben: Prontosan® Wundspüllösung enthält Konservierungsmittel und kann nach Anbruch 8 Wochen lang genutzt werden. Zur Vermeidung von Verunreinigungen ist die Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch zu verschließen. Während der Anwendung sollte der Kopf der Flasche vor Verunreinigung geschützt werden. Flaschen, die in direkten Kontakt mit der Wunde gekommen sind oder auf sonstige Weise verunreinigt wurden, müssen entsorgt werden.

Zusammensetzung: Gereinigtes Wasser, Betain-Tensid, 0,1 % Polyaminopropylbiguanid (Polihexanid). **Aussehen und Geruch:** klare, farb- und nahezu geruchlose wässrige Lösung. **Haltbarkeit:** siehe Haltbarkeitsdatum (Verw. bis:). Lagerung bei Raumtemperatur. **Originalität:** steril: Versiegelungsring als Garantie für die Originalität. **Ampullen:** Ausschließlich für den Einmalgebrauch.

5. Съвместимост и биокомпатибилност: Дерматологично тестван и оценен като нездразнещ и добре поносим; без причиняване на болка, без възпрепятстване на грануларизацията и епителизирането.

6. Странични ефекти: В много редки случаи след прилагане на Prontosan® може да се получи лек парещ усет, който обаче обикновено отшумява след няколко минути. Prontosan® може да предизвика алергична реакция като сърбеж (уртикария) и обрив (екзантема). В редки случаи (по-малко от 1 на 10 000) се наблюдава анафилактичен шок.

7. Противопоказания:
Prontosan® не трябва да се използва:
a) ако за пациента се знае или се предполага, че е алергичен към някоя от съставките на продукта.
b) върху централната нервна система или близките обвивки.
c) в средното или вътрешното ухо.
d) върху очите.
e) върху хиалинови хрущяли и при асептична операция на ставите. Ако Prontosan® на практика влиза в контакт с асептичен хрущял, той трябва незабавно да се измие с разтвор на Рингер или обикновен физиологичен разтвор.
f) в комбинация с анионни тензиди.
g) в комбинация с почистващи сапуни, мазила, масла, ензими и др. Тези вещества трябва да се отстраняват напълно от раната преди употреба.
h) за перитонеална промивка или изплакване.

8. Ограничения за употреба: Бременност и период на кърмене: Няма данни за мутагенна или ембрионална токсичност, свързана със съставките на този продукт. Тъй като няма системна абсорбция на полихексанид, преминаването му към млякото на кърмачката е малко вероятно. Поради липсата на съответни клинични проучвания и клиничен опит с бременни жени и кърмачки, в тези случаи хирургичният разтвор Prontosan® трябва да се използва само след надлежна медицинска консултация.

9. Общи инструкции за безопасност: Само за външна употреба. Не използвайте за инфузия или инжектиране. Да не се поглъща.
Не използвайте повредени бутилки. Пазете бутилките от пряка слънчева светлина. Дръжте далеч от досега на деца.

10. Обобщение / техническа информация: Изгарателният разтвор Prontosan® е консервиран продукт със срок на годност 8 седмици след отваряното му. Бутилката трябва да се затвори незабавно след употреба, за да не се допусне замърсяване. Горната част на бутилката трябва да се пази от замърсяване по време на употреба. Бутилки, които са влезли в пряк контакт с раната или са замърсени по друг начин, трябва да се изхвърлят.

Състав: Пречистена вода, повърхностно-активно вещество бетаин, 0,1% полиаминопропилен бигуанид (полихексанид).

Външен вид и миризма: бистър, безцветен и почти без миризма воден разтвор. **Срок на годност без отваряне:** в зависимост от датата на изтичане на срока на годност; да се съхранява на стайна температура. **Оригинална опаковка:** стерилен, оригинално запечатан. **Ампули:** само за еднократна употреба.

EE Prontosan® – haavaloputuslahus

Kasutusjuhend akuutsete, krooniliste ja infitseerunud nahahaavade, 1. ja 2. astme põletuste puhastamiseks, loputamiseks ja niisutamiseks

1. Sissejuhatus: Krooniliised nahahaavad on enamasti kaetud nekrootilise koe jalvli biokilega. Nende kihtide eemaldamine on keeruline ja need viivad aeglustada haava paranemist. Prontosan® haavaloputuslahus suudab oma puhastava toimega need haava paranemist takistavad barjäärid eemaldada.

Põhjalik puhastamine on samuti näidustatud akuutsete haavade korral, sest saasteosakesed ja mikroorganismid võivad takistada haava tavapärast paranemisprotsessi ja põhjustada komplikatsioone nagu näiteks infektsioon.

Tänu unikaalsele koostisele (mikroobidevastane aine, polühekasiid ja surfaktant betaiin) on Prontosan® ideaalne vahend biokile tekke vältimiseks.

2. Toote iseloomustus ja kasutamise näidustused:
Puhastamiseks ja loputamiseks ning ka niisutamiseks järgmistel juhtudel:
a) akuutsed infitseerumata ja infitseerunud haavad: - traumaatilised haavad (nt nahalatserisatsioonid, hammustused, lõikehaavad või lõmastused); - postoperatiivsed haavad ;
b) kroonilised infektsioonivabad ja infektsiooniga haavad: sh survehaavad, diabeetilised ja diabeetilised haavandid;
c) termilised ja keemilised haavad:1. ja 2. astme põletused, söövitused;
d) kiiritusjärgsed haavad;
e) fistulid ja abstsessid;
f) uroloogiliste kateetrite, PEG-/PEJ-torude või dreenide sissetuskohad;
g) peristomaalne nahk.

Operatsioonieelhaavelises haavade puhastamiseks ja loputamiseks.
Lahusena kasutuseks haavade vaakumravis.
Kuivanud haavakatete ja sidemete niisutamiseks eemaldamise eel.

3. Üldine kasutamine: Prontosan® haavaloputuslahust (vt vastava toote teavet) tuleks kasutada haava puhastamiseks enne ravi Prontosan® haavageeliga või Prontosan® haavageeliga X.
Prontosan® haavaloputuslahust võib kasutada kompresside, marlide või puhastuslappide niisutamiseks vastavalt vajadusele.
Lahust tuleks kasutada sageli, et saavutada ja säilitada haava visuaalne puhtus.
Prontosan® haavaloputuslahuse võib kasutamise eel soojendada kehatemperatuurini.
Haavakatted ja sidemed on sageli kõvaks muutunud ja kleepunud haava pinnale. Nende katete eemaldamine võib haavapõhja traumeerida ja haava paranemist edasi lükata. Raskesti eemaldatavate kuivade haavakatete ja sidemete puhul on soovitatav leotada haavakatet Prontosan® haavakattelahusega, kuni need saab õrnalt eemaldada.

4. Haava puhastamine: kogu haav ja seda ümbritsev piirkond tuleb hoolikalt puhastada Prontosan®-i haavaloputuslahusega.
Mitteraskete ja akuutsete haavade korral piisab loputamisest. Suurt piirkonda katvate haavade, samuti raskesti ligipääsetavate haavade korral on soovitatav kahjustatud piirkonda leotada Prontosan®-i haavaloputuslahusega immutatud kompressiga vähemalt 15 minutiks. Lahust tuleb kasutada lahjendamata.

5. Kudede taluvus ja toote biosobivus: Väga harvadel juhtudel võib Prontosan®-i kasutamise järel esineda kerget põletustunnet, kuid see möödub mõne minuti järel. Prontosan® võib põhjustada allergilisi reaktsioone nagu sügelus (urtikaaria) ja lööved (eksanteem). Harvadel juhtudel (vähem kui 1 juhtum 10 000 kohta) on esinenud anafülaktilist šokki.

6. Kõrvaltoimed: Väga harvadel juhtudel võib Prontosan®-i kasutamise järel esineda kerget põletustunnet, kuid see möödub mõne minuti järel. Prontosan® võib põhjustada allergilisi reaktsioone nagu sügelus (urtikaaria) ja lööved (eksanteem). Harvadel juhtudel (vähem kui 1 juhtum 10 000 kohta) on esinenud anafülaktilist šokki.

7. Vastunäidustused:
Prontosan®-i ei tohiks kasutada:
a) patsientidel, kellel on esinenud allergiat või kahtlustatakse allergilise reaktsiooni esinemist mõne koostisosa vastu;
b) kesknärvisüsteemis või ajukelmetel;
c) kesk- või sisekõrvas;
d) silmades;
e) hüaliinkõhredel ja aseptiliste liigeseoperatsioonide käigus. Juhul, kui Prontosan® siiski puutub kokku aseptilise kõhrega, tuleks seda viivitamatult loputada Ringeri lahuse või füsioloogilise soolalahusega.
f) koos anioonsete surfaktantidega;
g) koos puhastusseepide, salvide, õlide, ensüümidega jms ga. Need ained tuleb haavast enne geeli kasutamist hoolikalt eemaldada;
h) peritoneaalseks loputamiseks.

8. Piirangud kasutamisel: Rasedus ja imetamine: toote koostisosade mutageensete või embrüotoksiliste omaduste kohta andmed puuduvad. Kuna polühekasiidi ei imendu süsteemselt, siis toimeaine sattumine rinnapiima on vähetõenäoline. Kliiniliste uuringute ja pikaajalise kogemuse puudumise tõttu rasedate ja imetavate naiste, vastsündinute ja imikutega, võib neil Prontosan® haavaloputuslahust kasutada ainult hoolika meditsiinilise hindamise järel.

9. Üldised ohutusnõuded: Ainult välispidiseks kasutamiseks. Mitte infundeerida ega süstida. Ärge neelake. Ärge kasutage vigastatud pudeleid. Kaitske pudeleid otsese päikesevalguseest. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

10. Kokkuvõte/tehniline teave: Prontosan® haavaloputuslahus on säilitusainetid sisaldav toode ja selle säilivusaeg on 8 nädalat avamisest. Saastumise vältimiseks tuleks pudel sulgeda vahetult pärast kasutamist. Pudeli otsa tuleks kasutamise ajal kaitsta saastumise eest. Pudelid, mis on puutunud vahetult vastu haava või muul viisil saastunud, tuleks minema visata.

Koostis: süstesvesi, betaiinsurfaktant, 0,1 % polüaminopropüülbiguaniid (polüheksaniid). **Välisilme ja lõhn:** selge, värvitu ja peaaegu lõhnatu vesilahus. **Säilivusaeg:** vastavalt kõlblikkusajale; säilitage toatemperatuuril. **Originaalkuju:** steriilne, originaalkork. **Ampullid:** vaid ühekordseks kasutamiseks.

HU Prontosan® seblemosó oldat

Utasítások az akut, krónikus és fertőzött sebek, illetve első- és másodfokú égési sebek tisztításához, kimosásához és nedvesítéséhez

1. Bevezetés: A krónikus bőrsérüléseket gyakran párkós, elhalt szövet és/vagy biofilm réteg fedi. Ezeket a rétegeket nehéz eltávolítani, és ez a seb késleltetett gyógyulásához vezet. A Prontosan® sebkimosó oldat a tisztító hatásának köszönhetően képes eltávolítani a sebgyógyulást gátló ezen rétegeket.

Az akut sebek is megfelelő tisztítást igényelnek, mert általában szennyeződések és mikroorganizmusokkal szennyeztek. Ezek a szennyeződések gátolják a szokásos sebgyógyulási folyamatot, és olyan komplikációkhoz vezethetnek, mint például a fertőzés.

Az összetevők egyedi kombinációjának köszönhetően (a polihexanid antimikrobiális anyag és a betain felületaktív anyag) a Prontosan® idealisan használható a biofilm létrejöttének megakadályozásához.

2. Termékprofil és felhasználási területek:
A következők tisztításához, ábliteléshez, valamint nedvesítéshez:
a) akut nem fertőzött és fertőzött sebek: traumás sebek (pl. bőrfelszakadások, harapások, vágások vagy zúzódások): - műtét utáni sebek;
b) krónikus nem fertőzött és fertőzött sebek (pl. nyomási fekélyek, vénás lábfekélyek, diabetikus lábfekélyek);
c) égési sebek (első és másodfokú égési sérülések), fagyások;
d) kémiai behatás vagy sugárzás okozta sebek;
e) fisztulák és tályogok;
f) urológiai katéter, PEG/PEJ szonda és drenázs katéter kimeneti nyílásai;
g) sztóma körüli bőr.

A sebek intraoperatív tisztításához és lemosásához.
Negatív nyomásos sebterápiával kombinált instilláciához.
Beragadt kötések és pólyák nedvesítéséhez eltávolítás előtt.

3. Általános használat: A Prontosan® sebkimosó oldat (lásd a különálló termékjájékoztatót) sebtisztításhoz használandó a Prontosan® sebgél vagy Prontosan® X sebgél készítményekkel történő kezelés előtt.
A Prontosan® sebkimosó oldat szükség szerint használható a kötések, kötözőgézek vagy pólyák átnedvesítéséhez a tisztítás során.
A vizuálisan tiszta seb eléréséhez és fenntartásához a készítményt gyakran kell alkalmazni.
A Prontosan® sebkimosó oldat a használat előtt testhőmérsékletre melegíthető.
A sebre helyezett kötések és pólyák gyakran beragadnak, és a seb felületéhez tapadnak. Ezen kötések eltávolítása traumatizálhatja a sebágyat, ami a sebgyógyulás késleltetéséhez vezethet. Azokban az esetekben, amikor a kötések és pólyák eltávolítása a beragadás miatt nehézségbe ütközik, javasolt a kötés Prontosan® sebkimosó oldattal való átitatása, amíg azok könnyen eltávolíthatóvá nem válnak.

4. Sebtisztítás: A teljes sebet, illetve az azt körülvevő területet alaposan meg kell tisztítani a Prontosan® sebkimosó oldattal.
Nem súlyos és akut sebek esetében elegendő az ölítés. Nagy kiterjedésű, illetve nehezen hozzáférhető helyen lévő sebek esetében ajánlott az érintett terület Prontosan® sebkimosó oldattal történő áztatása legalább 15 percen át, egy átitatott gézlap segítségével. Az oldatot hígítatlanul kell használni.

5. Szöveti tolerancia és biokompatibilitás: Bőrgyógyászatilag tesztelt és nem irritatívként és jól tolerálttként értékelt; fájdalommentes; nem akadályozza a granulációt vagy az epithelializációt.

6. Mellékhatások: Nagyon ritkán a Prontosan® alkalmazását követően enyhe égető érzés jelentkezhet, ez néhány perc után általában megszűnik. A Prontosan® allergiás reakciót válthat ki, így például viszketést (urticaria) és bőrkiütést (exanthema). Ritkán (10 000 betegből kevesebb mint 1 esetben), anaphylaxiás sokkot jelentettek.

7. Ellenjavallatok:
A Prontosan® alkalmazása ellenjavallt:
a) ha ismert vagy gyanított, hogy a beteg allergiás a termék valamely összetevőjére;
b) a központi idegrendszeren és az agyhártyán;
c) a középfülben;
d) a szemben;
e) a hialinporcon és aszeptikus ízületi műtéteknél – ha a Prontosan® érintkezik az aszeptikus porccal, azonnal le kell mosni Ringer oldattal vagy normál sóoldattal;
f) anionos felületaktív anyagokkal kombinálva;
g) tisztító szappanokkal, kenőcsökkel, olajokkal, enzimekkel stb. kombinálva – ezeket az anyagokat a használat előtt alaposan el kell távolítani a sebről;
h) peritonealis mosáshoz vagy öblítéshez.

8. Felhasználása vonatkozó korlátozások: Terhesség és szoptatás alatt: Nincs bizonyíték a jelen termék összetevőihez kapcsolódó mutagén vagy embrionális toxicitásra. Mivel a polihexanid szisztémás újrafelszívódására nem kerül sor, az anyatejbe való kiválasztódása nem valószínű. Mivel a terhes és szoptató nők esetében nem végeztek releváns klinikai vizsgálatokat, és nincs ezzel kapcsolatos klinikai tapasztalat, a Prontosan® Sebkimosó oldatot ilyen esetekben csak alapos orvosi konzultációt követően szabad használni.

9. Általános biztonságossági utasítások: Kizárólag külső használatra. Ne használja infúzióhoz vagy injekcióhoz.Ne nyelje le. Ne használja fel a sérült üvegeket. Az üvegek közvetlen napfénytől távol tartandók. Gyermekektől elzárva tartandó.

10. Összegzés és műszaki információk: A Prontosan® sebkimosó oldat tartósított termék, és felnyitás után 8 hétig tárolható. A szennyeződés elkerülése érdekében az üveget a használat után azonnal le kell zárni. Az üveg tetejét a használat során védeni kell a szennyeződéssel szemben. Ki kell dobni azokat az üvegeket, amelyek közvetlenül érintkeztek a sebbel vagy más módon szennyeződtek.

Összetétel: tisztított víz, betain felületaktív anyag, 0,1% poliaminopropil-biguanid (polihexanid).

Külső megjelenés és szag: átlátszó, színtelen és gyakorlatilag szagtalan vizes oldat. **Felhasználhatósági időtartam:** a lejárati dátumnak megfelelően; szobahőmérsékleten tárolva. **Eredetiség:** steril, eredetiséget bizonyító zár. **Ampullák:** kizárólag egyszeri használatra.

IT Prontosan® – Soluzione detergente per ferite

Istruzioni per la detersione, lavaggio e idratazione delle lesioni cutanee acute, croniche e infette e delle ustioni di I e II grado

1. Introduzione: Le ferite cutanee croniche sono spesso coperte da una crosta di tessuto necrotico e/o da biofilm. La rimozione di questi strati è difficoltosa e comporta un ritardo nella guarigione della ferita. La soluzione detergente per ferite Prontosan®, grazie al suo potere detergente, è in grado di eliminare le barriere che ostacolano la guarigione della ferita.

Anche le ferite acute devono essere pulite accuratamente in quanto sono generalmente contaminate da detriti cellulari e micro-organismi. Questi agenti contaminanti possono interferire con il normale processo di guarigione della ferita e creare complicazioni, come ad esempio infezioni.

Grazie alla speciale combinazione dei suoi componenti (sostanza antimicrobica, poliesanide e il tensioattivo betaina), Prontosan® è ideale per prevenire la formazione di biofilm.

2. Profilo del prodotto e aree di utilizzo
Per la detersione, l'irrigazione e l'idratazione di:
a) lesioni acute non infette e infette: - lesioni traumatiche (come lacerazioni cutanee, morsi abrasioni o ferite da taglio); - lesioni post-operatorie;
b) lesioni croniche non infette e infette incluse piaghe da decubito, ulcere venose e ulcere diabetiche;
c) lesioni chimiche e termiche (ustioni di I e II grado, ustioni chimiche);
d) lesioni radioindotte;
e) fistole e ascessi;
f) porti di entrata per cateteri urologici, sonde PEG-/PEJ e tubi di drenaggio;
g) cute peristomizzata.

Per pulizia intrachirurgica e per irrigazione di ferite.
Per instillazione in combinazione a terapia della ferita a pressione negativa.
Per ammollare di medicazioni e bendaggi incrostati prima della rimozione

3. Istruzioni generali di sicurezza: Solo per uso esterno. Non utilizzare per infusioni o iniezioni. Non ingerire. Non utilizzare se il flacone è danneggiato. Tenere il flacone al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

10. Riepilogo/informazioni tecniche: La soluzione detergente per ferite Prontosan® è un prodotto conservato e deve essere consumato entro 8 settimane dall'apertura. Per evitare contaminazione, il flacone deve essere chiuso immediatamente dopo l'utilizzo. Durante l'utilizzo, la parte superiore del flacone deve essere protetta per evitare la contaminazione. I flaconi venuti a contatto diretto con la ferita o contaminati in altro modo devono essere eliminati.

Composizione: acqua depurata, tensioattivo betaina, poliaminopropil biguanide allo 0,1% (poliesanide). **Aspetto e odore:** soluzione acquosa trasparente, incolore e praticamente inodore. **Durata:** si veda la data di scadenza. Conservare a temperatura ambiente. **Fiale:** esclusivamente monouso.

5. Tollerabilità tissutale e biocompatibilità: Soluzione testata dermatologicamente e risultata non irritante e ben tollerata; indolore; non inibisce la granulazione e l'epitelizzazione.

6. Effetti collaterali: In casi molto rari, dopo l'applicazione di Prontosan® si può verificare un lieve bruciore che generalmente svanisce dopo pochi minuti. Prontosan® può causare reazioni allergiche quali prurito (orticaria) ed eruzioni cutanee (esantemi). In rari casi (meno di 1 caso su 10.000) si è verificato shock anafilattico.

7. Controindicazioni
Prontosan® non deve essere utilizzato nei seguenti casi:
a) se il paziente è allergico o se si sospetta che sia allergico a uno dei componenti del prodotto;
b) sul SNC o sulle meningi;
c) nell'orecchio medio o interno;
d) negli occhi;
e) nella cartilagine ialina e negli interventi asettici sulle articolazioni. Se Prontosan® viene a contatto con la cartilagine asettica, occorre irrigare immediatamente con soluzione Ringer o con normale soluzione fisiologica;
f) in combinazione con tensioattivi anionici;
g) in combinazione con saponi, unguenti, oli, enzimi ecc. Prima dell'utilizzo di Prontosan® è necessario eliminare completamente tali sostanze dalla ferita;
h) per il lavaggio o l'irrigazione peritoneale.

8. Restrizioni di impiego Gravidanza e allattamento: non è nota alcuna attività mutagena o tossicità embriotale associabile ai componenti di questo prodotto. Poiché non si verifica un riassorbimento sistemico del poliesanide, la trasmissione nel latte materno è improbabile. Data la mancanza di sperimentazioni ed esperienze cliniche con donne in gravidanza e allattamento, in questi casi la soluzione detergente per ferite Prontosan® deve essere usata solamente dopo un attento consulto medico.

9. Istruzioni generali di sicurezza: Solo per uso esterno. Non utilizzare per infusioni o iniezioni. Non ingerire. Non utilizzare se il flacone è danneggiato. Tenere il flacone al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

10. Riepilogo/informazioni tecniche: La soluzione detergente per ferite Prontosan® è un prodotto conservato e deve essere consumato entro 8 settim

Prontosan® – Wound Irrigation Solution

Izlasiet lietošanas instrukcijas.
Lees voor gebruik zorgvuldig.
Les bruksanvisningen.
Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą używania.
Ler as instruções de uso.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

Derīguma termiņš pēc atvēršanas: 8 nedēļas
Houdbaarheid na openbreken: 8 weken.
Holdbar i: 8 uker etter åpning
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 8 tygodni.
Val. após abertura: 8 semanas.
Perioada de valabilitate după prima deschidere: 8 săptămâni.

Izziedēt līdz: mēnesis un gads
Gebruiken tot: maand en jaar
Brukes før: måned og år
Termin przydatności: miesiąc i rok
Val: mês e ano
A se folosi înainte de : lună și an

Kataloga numurs
Lotnummer
Partijnummer
Numer serii
Lote
Serie

Sērijas numurs
Produkta kods
Buiten het bereik van kinderen houden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Conservar ao alcance da vista e do alcance das crianças.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Sterilizēts A
Steriel A
Sterilt A
Sterylizowane A
A esterili

Ražotājs
Fabrikant
Producent
Producent
Fabricante
Producător

Lietošanai tikai vienu reizi.
Voor éénmalig gebruik.
Kun engangsbruk.
Tylko do jednorazowego użytku.
Uso único
De unică folosință.

ES pilnvarots pārstāvis
Erkende vertegenwoordiger in de EU
Autoriseret repræsentant i EU
Autoryzowany przedstawiciel UE
Representante autorizado da UE
Reprezentant autorizat în UE

Ierīces identifikācijas numurs
Uniek apparaat-ID
Unik udstyrsidentifikation
Niepowtarzalny identyfikator wyrobu
Identificador único do dispositivo
Identificator unic al dispozitivului

Importētājs
Importeur
Importør
Importer
Importador
Importator

LV Prontosan® šķīdums brūču skalošanai

Lietošanas instrukcija akūtu, hronisku un inficētu dabas brūču, 1. un 2. pakāpes apdegumu tīrīšanai, skalošanai un mitrināšanai

1. Ievads: Hroniskas ādas brūces bieži ir pārklātas ar krevelēm, nekrotiskiem audiem un/vai bioplēvi. Sos pārklājumus ir grūti noņemt, un tie var palēnināt brūču sadzīšanu. Prontosan® šķidumam brūču skalošanai piemīt attīrīšanas spēja, un tas spēj aizvākt šos slāņus, kas traucē brūču sadzīšanu.

Akūtas brūces ir nepieciešams arī labi iztīrīt, jo parasti tās ir piesārņotas ar netīrumiem un mikroorganismiem. Sie piesārņojumi var traucēt normālu brūču dzīšanu un radīt komplikācijas, piemēram, infekciju.

Prontosan® ir unikālu sastāvdaļu kombinācija (antimikrobāla viela, poliheksanīds, virsmaktīvā viela betaīns), un tas ir ideāls līdzeklis pret bioplēves veidošanos.

2. Produkta apraksts un lietošanas jomas:
Tīrīšanai un skalošanai, kā arī mitrināšanai šādos gadījumos:
a) akūtas neinficētas un inficētas brūces; traumatiskas brūces: pēstās ādas brūces, kostas brūces, grieztas brūces, nobrāzumi un saspiešumi; pēcoperāciju brūces;
b) hroniskas neinficētas un inficētas brūces: izgulējumi, vēnu čūlas, diabētiskās čūlas;
c) termiskās un ķīmiskās brūces: 1. un 2. pakāpes apdegumi; ķīmisks apdegums.
d) apstarojuma izraisītas brūces.
e) fistulas un augoņi.
f) uroloģisko katetru, PEG/PEJ (perkutānas endoskopiskas gastrostomas/takšas zarnās) caurulīšu un drenāžas caurulīšu ievadīšanas vietas.
g) peristomas āda.

Brūču tīrīšanai un skalošanai operācijas laikā.
Skalošanai kopā ar negatīvu spiediena brūču terapiju.
Sokaltšu apspiju un bandāžu samitrināšanai pirms noņemšanas.

3. Vispārīgā lietošana: Prontosan® šķidums brūču skalošanai (skatīt atsevišķu produkta informāciju) ir jālieto brūču tīrīšanai pirms brūču apstrādes ar Prontosan® brūču gēlu vai Prontosan® brūču gēlu X.
Prontosan® šķidumu brūču skalošanai var lietot, lai piesūcinātu kompreses, marles saiti vai tamponus, kas pēc vajadzības tiek izmantoti tīrīšanā.
Apstrāde ir jāveic mazākā niezkocīnie pi uzņēmumā, ar kuru nav bijusi nekāda saistība.
Opatrunki ir bandāžas cieši pirms to noņemšanas. Pirms lietošanas var uzsildīt līdz ķermeņa temperatūrai.
Brūču apspiju un bandāžas bieži sakalst un cieši piešķīp pie brūces virsmas. Šo apspiju noņemšana var traumēt brūces pamatni, kas savukārt var aizkavēt brūces sadzīšanu. Ja sakaltumu dēļ apspijus un bandāžas ir ļoti noņemt, ieteicams apspiju iemērcināt Prontosan® šķidumā, līdz tas kļūst viegli noņemams.

4. Brūču tīrīšana: Ar Prontosan® šķidumu brūču skalošanai ir rūpīgi jānotīra visa brūce, ieskaitot zonu ap brūci.
Brūcēm, kas nav nopietnas un ir akūtas, pietiek ar noskalošanu. Nas brūcēm, kas pārklāts zonu, kā arī brūcēm, pie kurām ir grūti piekļūt, ieteicams skarto zonu mērcēt Prontosan® šķidumā brūču skalošanai vismaz 15 minūtes, izmantojot piesūcinātu kompresi. Šķidums ir jālieto neatšķaidīts.

5. Audu panesamība un bioloģiskā saderība: Dermatoloģiski testēts un noteikts kā nekairinošs, labi panesams, nesāpīgs, granulāciju un epitelizāciju nenomācošs līdzeklis.

6. Blakusparādības: Ļoti retos gadījumos pēc Prontosan® lietošanas var būt viegli dedzinošana sajūta, taču tā parasti izzūd pēc dažām minūtēm. Prontosan® var izraisīt alerģiskas reakcijas, kā niezēšanu (nātrene) un izsitumus (eksantēma). Retos gadījumos (mazāk nekā 1 gadījumā no 10 000) ir ziņots par anafilaktisku šoku.

7. Kontrindikācijas:
Prontosan® nedrīkst lietot:
a) ja ir zināms, ka pacientam ir alerģija, vai ir aizdomas, ka pacientam ir alerģija pret kādu no produkta sastāvdaļām;
b) uz CNS vai galvas smadzeņu apvalkiem.
c) vidusausi vai iekšējā ausī.
d) acīs.
e) uz hialīna šķiršņa un aseptiskā locītavu operācijā.
Prontosan® nonāk saskarsmē ar aseptisku skrimsli, tam ir nekavējoties jāveic skalošana ar Ringera šķidumu vai parasto fizioloģisko šķīdumu.
f) kopā ar anijonu virsmaktīvām vielām.
g) kopā ar magzāšanas ziepēm, ziedēm, eļļām, enzīmiem
h) Pirms lietošanas šīs vielas ir rūpīgi jānovāc no brūces.
h) peritoneālai dialīzei vai skalošanai.

8. Lietošanas ierobežojumi: Grūtniecība un barošana ar krūti: Nav liecību par mutagēno vai augļa toksicitāti, kas būtu saistīta ar šī produkta sastāvdaļām. Tā kā nenotiek polihexanīda sistēmiska reabsorbcija, pārnešana uz krūts pienu ir mazvarbūtīga. Sakarā ar to, ka nav veikti attiecīgi klīniskie pētījumi un trūkst klīniskās pieredzes ar grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti, šādos gadījumos Prontosan® šķidumu brūču skalošanai drīkst lietot tikai pēc rūpīgas medicīniskas konsultācijas.

9. Vispārīgi drošības norādījumi: Tikai ārējai lietošanai. Nelietot infūzijām un injekcijām! Nenorīt! Nelietot šķidtās brūcēs, kas pildītas tiešos saules staros. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

10. Kopsavilkums/tehniskā informācija: Prontosan® šķidums brūču skalošanai ir lateralvēts produkts un tā uzglabāšanas laiks pēc atvēršanas ir 8 nedēļas. Pēc lietošanas pudele ir nekavējoties jāaizver, lai novērstu piesārņojumu. Lietošanas laiks pudeles kaklā ir jāsargā no piesārņošanas. Pudeles, kas ir tieši saskārušās ar brūci vai kādā citā veidā ir tikšas piesārņotas, ir jāizmet.

Sastāvs: attīrīts ūdens, betaīna virsmaktīvā viela, 0,1% poliaminopropilbiguanīds (poliheksanīds). **Izskats un smarža:** dzidrs, bezkrāsains ūdens šķidums, kam praktiski nav smaržas. **Iepakošanas veids:** nordēdītais derīguma termiņš; uzglabāt istabas temperatūrā. **Autenticitātums:** sterilitātes, autentiskuma plomba. **Ampulas:** tikai vienreizējai lietošanai.

11. Uzglabāšanas apstākļi: Uzglabāt sausā vietā istabas temperatūrā (15–25 °C). Nesasalt.

12. Ražotājs: Prontosan® ražo B. Braun Medical AG, Sesatz 17, CH-6204 Sempach, Switzerland.

NL Prontosan® – oplossing voor wondirrigatie

Gebruiksinstructies voor het reinigen, spoelen en bevochtigen van acute, chronische en geïnfecteerde huidwonden; eerste- en tweedegraads brandwonden

1. Inleiding: Chronische huidwonden zijn vaak bedekt met dood, necrotisch weefsel en/of een biofilm. Deze zijn moeilijk te verwijderen en zorgen voor een vertraagd genezingsproces. Prontosan® oplossing voor wondirrigatie is door zijn reinigende werking in staat deze barrières voor de wondgenezing te verwijderen.

Acute wonden vereisen ook een goede reiniging omdat zij over het algemeen verontreinigd zijn met vuilresten en micro-organismen. Deze verontreinigingen kunnen het normale wondgenezingsproces belemmeren en leiden tot complicaties, zoals infecties.

Dankzij de unieke combinatie van bestanddelen (bijv. de antimicrobiële stof, polihexanide, en de oppervlakteactieve stof, betaïne), is Prontosan® ideaal om de vorming van een biofilm te voorkomen.

2. Productprofiel en toepassingsgebieden
Voor het reinigen en spoelen plus bevochtigen van:
a) acute niet-geïnfecteerde en geïnfecteerde wonden: – traumatische wonden (bv. laceraties van de huid, bijv. wonden ontstaan door verbrijzelingen); – postoperatieve wonden.
b) chronische niet-geïnfecteerde en geïnfecteerde wonden, waaronder: doorligwonden; veneuze zweren; diabetische zweren.
c) brand- en chemische wonden: eerste- en tweedegraadsbrandwonden; chemische brandwonden.
d) wonden na een bestraling.
e) fistels en abcessen.
f) ingangspunten van urologische katheters, PEG/PEJ-buizen of drainageslangen.
g) peristomale huid.

Voor intra-operatieve reiniging en irrigatie van wonden.
Voor indrupbeling in combinatie met onderdruk-wondtherapie.
Voor de bevochtiging van aan de wonde vastgekorste verbanden en bandages alvorens ze verwijderd worden.

3. Algemeen gebruik: Prontosan® oplossing voor wondirrigatie (raadpleeg de afzonderlijke productinformatie) moet voor de wondreiniging worden gebruikt vóór de behandeling met Prontosan® wondgel of Prontosan® wondgel X.
Prontosan® oplossing voor wondirrigatie kan worden gebruikt om kompressen, gaas of verbanden voor de reiniging te doordrenken, voor zover nodig.
Deze procedure moet frequent worden toegepast om een visueel schone wonde te krijgen en te houden.
Prontosan® oplossing voor wondirrigatie is een steriel, niet-cytotoxisch product dat geschikt is voor gebruik tot op lichaamstemperatuur worden opgewarmd.
Wondverbanden en bandages zitten vaak vast aan de wondkorst en moet Prontosan® oplossing voor wondirrigatie voor deze verbanden kan het wondbed traumatiseren, met als gevolg een vertraagde genezing van de wonde. In gevallen waarbij verbanden en bandages als gevolg van kostwinning moeilijk los te maken zijn, wordt aanbevolen het verband te doordrenken met Prontosan® oplossing voor wondirrigatie tot het voorzichtig kan worden verwijderd.

4. Wondreiniging: De gehele wonde, en ook het omringende gebied, moeten grondig worden gereinigd met Prontosan® oplossing voor wondirrigatie. Voor niet-ernstige en acute wonden is spoelen voldoende. Voor wonden die een groot gebied bedekken en ook wonden die moeilijk te bereiken zijn, wordt aanbevolen om een aangepaste gebied door middel van een verzadigd kompres ten minste 15 minuten in Prontosan® oplossing voor wondirrigatie te laten weken. De oplossing moet onverdund worden gebruikt.

5. Weefseltolerantie en biocompatibiliteit: Dermatologisch getest en beoordeeld als niet-irriterend en goed verdraagbaar; pijnloos; geen remming van de granulatie of epitheelvorming.

6. Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen kan er een mild branderig gevoel optreden na aanbrenging van Prontosan®, maar dit verdwijnt gewoonlijk na enkele minuten. Prontosan® kan allergische reacties veroorzaken zoals jeuk (netelroos) en uitslag (exantheem). In zeldzame gevallen (minder dan 1 op 10.000) is een anafylactische shock gerapporteerd.

7. Contra-indicaties:
Prontosan® mag niet worden gebruikt:
a) als bekend is dat de patiënt allergisch is of als de patient vermoedelijk allergisch is voor één van de bestanddelen voor deze producten;
b) op het CZS of de hersenvliezen.
c) in het midden- of binnenoor.
d) in de ogen.
e) op hyaliene kraakbeen en bij een aseptische gewrichtsoperatie. Als Prontosan® in contact komt met aseptisch kraakbeen, moet dit onmiddellijk worden geïrrigeerd met een ringeroplossing of een normale fysiologische zoutoplossing.
f) in combinatie met anionische tensides.
g) in combinatie met reinigingszepen, zalven, oliën, enzymen, etc. Deze stoffen moeten voor gebruik grondig worden verwijderd van de wonde.
h) voor buikvlieslavage of -spoeling.

8. Gebruiksbeperkingen: Zwangerschap en lactatieve periode: Er is geen bewijs voor mutagenticiteit of toxiciteit voor het embryo in verband met de bestanddelen van dit product. Omdat er geen systemische herabsorptie van polyhexanide plaatsvindt, is overdracht naar de moedermelk onwaarschijnlijk. Omwille van een gebrek aan relevante klinische onderzoeken en klinische ervaring met zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, mag Prontosan® oplossing voor wondirrigatie in deze gevallen uitsluitend worden gebruikt na een zorgvuldig medisch consult.

9. Algemene veiligheidsinstructies: Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken voor infusie of injectie. Niet inslikken.
Geen beschadigde flessen gebruiken. Bewaar flessen uit de buurt van direct zonlicht. Buiten het bereik van kinderen houden.

10. Samenvatting/technische informatie:
Prontosan® oplossing voor wondirrigatie is een geconserveerd product en heeft een houdbaarheidsduur van 8 weken na opening. De fles moet onmiddellijk na het gebruik worden gesloten om contaminatie te voorkomen. De bovenkant van de fles moet tijdens het gebruik worden beschermd tegen verontreiniging. Flessen die in direct contact met de wonde zijn gekomen of op een andere manier verontreinigd zijn, moeten worden weggegooid.

Samenstelling: Gezuiverd water, betaïne-surfactans, 0,1 % polyaminopropylbiguanide (polyhexanide). **Uiterlijk en geur:** heldere, kleurloze en praktisch geurloze, waterige oplossing. **Houdbaarheidsduur:** overeenkomstig de uiterste houdbaarheidsdatum; bewaren op kamertemperatuur. **Oorsprongkelijkheid:** steriele, oorspronkelijkheidsverzegeling. **Ampullen:** uitsluitend voor eenmalig gebruik.

6. Bivirkninger: I svært sjeldne tilfeller kan det være en mild brennende følelse etter påføringen av Prontosan®, men dette går vanligvis over etter noen minutter. Prontosan® kan forårsake allergiske reaksjoner, slik som kløe(urticari) og utslett (exanthem). I sjeldne tilfeller (mindre enn 1 av 10 000), har det blitt rapportert om anafylaktisk sjokk.

7. Kontraindikasjoner:
Prontosan® skal ikke brukes:
a) hvis pasienten har kjent allergi, eller hvis det mistenkes at pasienten kan være allergisk overfor en av ingrediensene til produktet.
b) på CNS (sentralnervesystemet) eller meninges.
c) i mellomøret eller det indre øret.
d) i øynene.
e) på hyalin brusk og ved aseptisk leddkirurgi. Hvis Prontosan® kommer i kontakt med aseptisk brusk, skal det umiddelbart skylles med Ringers løsning eller vanlig saltvannsløsning.
f) i kombinasjon med anionisk tensider.
g) i kombinasjon med rengjøringsmidler, salver, oljer, enzymer osv. Disse stoffene skal fjernes omhyggelig fra såret før bruk.
h) til peritoneal vask eller skylling.

8. Bruksbegrensninger: Graviditet og amming: Det finnes ingen tegn på mutagen eller embryotoksisitet tilknyttet ingrediensene i dette produktet. Da det ikke finnes noen systemisk reabsorpsjon av polyhexanide, er overføringen til brystmelk usannsynlig. På grunn av mangel på relevante kliniske forsøk og klinisk erfaring med gravide og ammende kvinner, skal Prontosan® såryskyllingsløsning kun brukes etter nøye medisinsk konsultering i disse tilfellene.

9. Generelle sikkerhetsanvisninger: Kun for utvortes bruk. Skal ikke brukes til infusjon eller injeksjon. Må ikke svelges. Skadede flasker skal ikke brukes. Hold flasker unna direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn.

10. Sammendrag/teknisk informasjon: Prontosan® såryskyllingsløsning er et konservert produkt og har en lagringstid på 8 uker etter åpning. Flasken skal lukkes umiddelbart etter bruk for å forhindre kontaminering. Toppen på flasken skal beskyttes mot kontaminering under bruk. Flasker som har kommet i direkte kontakt med sår eller som har blitt kontaminert på en annen måte må kastes.

Sammensetning: Renset vann, betain overflateaktivt stoff, 0,1% polyaminopropyl biguanid (polyheksanid). **Utseende og lukt:** klar, fargeløs og praktisk talt luktfri, vannholdig løsning. **Holdbarhet:** avhengig av utløpsdato; skal oppbevares i romtemperatur. **Originalitet:** steril originalforsegling. **Ampuller:** kun til engangsbruk.

Forbehandling av sår
For irrigering av sår.
For bløtgjøring av tørre skorper.
For å fjerne biofilm.

Rengjøring av sår
For rengjøring av sår.
For å fjerne biofilm.

Fuktighetsbevarende sårbehandling
For å opprettholde et fuktig sårmiljø.

Sårbehandling etter debridement
For å fjerne biofilm.

Behandling av kronisk sår
For å fjerne biofilm.

Behandling av akutt sår
For å fjerne biofilm.

Behandling av brannsår
For å fjerne biofilm.

Behandling av kirurgisk sår
For å fjerne biofilm.

Behandling av traumatisk sår
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter strålebehandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter kjemoterapi
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter immunterapi
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter hormonterapi
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter målrettet terapi
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter kombinasjonsterapi
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter palliativ behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter symptomatisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter supportiv behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter adjuvant behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter neoadjuvant behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter profylaktisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter terapeutisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter diagnostisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter screening
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter monitorering
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter prognostisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter prediktiv behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter prevensjon
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter rehabilitering
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter habilitering
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter vedlikeholdsbehandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter overvåking
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter oppfølging
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter resurssenter
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter støttegruppe
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter hjemmesykepleie
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter hospice
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter sykehjem
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter rehabiliteringssenter
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter dagsenter
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter poliklinikk
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter sykehus
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter akuttmottak
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter intensivavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter operasjonsstue
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter fødeavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter barselavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter nyfødtavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter barneavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter ungdomsavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter voksenavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter eldreavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter geriatrisk avdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter palliativ avdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter hospitalavdeling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter poliklinikk
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter dagsenter
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter rehabiliteringssenter
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter sykehjem
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter hospice
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter hjemmesykepleie
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter støttegruppe
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter resurssenter
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter overvåking
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter oppfølging
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter vedlikeholdsbehandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter habilitering
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter rehabilitering
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter prediktiv behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter prevensjon
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter prognostisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter monitorering
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter screening
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter diagnostisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter terapeutisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter profylaktisk behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter neoadjuvant behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter adjuvant behandling
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter målrettet terapi
For å fjerne biofilm.

Behandling av sår etter immunterapi
For å fjerne biofilm.

**Behandling av sår etter hormonter